

4月12日に開催された「りんご防除予察会議」の内容についてご連絡いたします。

特別栽培

定期防除 第1回防除について (芽出し10日後)



散布量：全体系 10a当り 300ℓ

【特別栽培1型・2型共通】

- | | | | |
|------------|--------|----|--------------|
| ① ハーベストオイル | 100倍 | ダニ | 1,000ℓあたり10ℓ |
| ② ベフラン液剤25 | 1,000倍 | 殺菌 | 1,000ℓあたり1ℓ |

散布期間：4月14日～4月17日

一般栽培

定期防除 第1回防除について (芽出し10日後)

散布量：全体系 10a当り 300ℓ

【一般体系】

- | | | | |
|-------------|--------|----|--------------|
| ① ハーベストオイル | 100倍 | ダニ | 1,000ℓあたり10ℓ |
| ② ダイアジノン水和剤 | 1,000倍 | 殺虫 | 1,000ℓあたり1kg |
| ③ ベフラン液剤25 | 1,000倍 | 殺菌 | 1,000ℓあたり1ℓ |

散布期間：4月14日～4月17日

※今回の防除ポイント

モニリア病対策のベフラン液剤25は降雨直後に散布すると効果が高いので、天気予報を参考に散布計画を立てましょう。

また、前年病害虫多発園では落葉の除去やすき込みなど耕種的防除にも努めましょう。

特別栽培

定期防除 第2回防除について(開花7~10日前)

散布量：全体系 10a当り 400㍓

【特別栽培1型・2型共通】

①スコア顆粒水和剤 3,000倍 殺菌 1,000㍓あたり333g

散布期間：4月21日~24日

一般栽培

定期防除 第2回防除について(開花7~10日前)

散布量：全体系 10a当り 400㍓

【一般体系】

①スコア顆粒水和剤 3,000倍 殺菌 1,000㍓あたり333g

散布期間：4月21日~24日

※今回の防除ポイント

黒星病の早期感染時期（果実がく片、果そう葉裏側）になります。降雨があった場合は、降雨直後の散布で効果が高くなります。天気予報を確認し、散布計画を立てましょう。

(注) りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。

(注) 農作業事故には十分注意し作業を行ってください。

次回予察会議：令和4年4月25日(月)

J A いわて中央 園芸推進課 (担当：横澤) TEL：673-7485 FAX：673-7636
または各地域園芸特産課