

5月5日の予察を基に検討を行った内容についてご連絡いたします。

ミツバチ回収について（お願い）

※ミツバチ回収前の農薬散布は行わないで下さい。また、回収日が朝に当たる地域では朝4時30分～7時まで摘花剤の散布も行わないで下さい。

詳しくは「ミツバチ回収予定」のページをご覧ください

定期防除 第4回(落花期)防除について

散布量：全体系 10a当り 450㍓

【特別栽培1型・2型共通】

① ペンコゼブ水和剤,またはジマンダイセン水和剤

600倍 殺菌 1,000㍓あたり 1.67kg

② バイオマックスDF 3,000倍 殺虫 1,000㍓あたり 333g

散布期間：5月8日～5月12日

※散布期間内でも蜜蜂回収前は個人散布であっても散布禁止です。必ず回収日を確認すること。

【一般体系】

① フェニックスフロアブル4000倍 殺虫 1,000㍓あたり 250ml

② ペンコゼブ水和剤,またはジマンダイセン水和剤

600倍 殺菌 1,000㍓あたり 1.67kg

散布期間：5月8日～5月12日

※散布期間内でも蜜蜂回収前は個人散布であっても散布禁止です。必ず回収日を確認すること。

定期防除 第5回(落花10日後)防除について

散布量：全体系 10a当り 450ℓ

【特別栽培1型・2型共通】

- ① デランフロアブル 2,000倍 殺菌 1,000ℓあたり500ml
② ダースバンDF 3,000倍 殺虫 1,000ℓあたり333g

散布期間：5月18日～5月22日

※前回散布日より10日後を目安

※ワタムシ、モモチョッキリゾウムシ等が気にならない場合、ダースバンDFを抜いてもよい。

【一般体系】

- ① デランフロアブル 2,000倍 殺菌 1,000ℓあたり500ml
② ダースバンDF 3,000倍 殺虫 1,000ℓあたり333g

散布期間：5月18日～5月22日

※前回散布日より10日後を目安

※ワタムシ、モモチョッキリゾウムシ等が気にならない場合、ダースバンDFを抜いてもよい。

今回の防除ポイント

第4回（落花期）定期散布は前回散布日より10日後を目安に間隔が開き過ぎないことがポイントですが、蜜蜂回収日も確認して防除をお願いします。また、りんご重要病害のモニリア病、黒星病、黒点病、褐斑病などの重点防除時期に入りますので第4回以降も間隔が開かないように散布して下さい。

（注）りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。
※腐らん病は確認したならすぐにせん除、削り取り等、適切に処置して下さい。

次回予察会議：令和4年5月24日（火）

- ※ 農作業事故には十分注意し作業を行ってください。
- ※ 不明な点がございましたらご連絡ください。



J A いわて中央、園芸推進課（担当：横澤） TEL：673-7485 FAX：673-7636
各地域園芸特産課