

6月22日に開催された「りんご防除予察会議」の内容についてご連絡いたします。

特別栽培

定期防除 第8回防除について

散布量：全体系 10a当り 550㍓

【特別栽培1型・2型共通】

- | | | | |
|---------------|--------|----|----------------|
| アビオンE | 2,000倍 | 展着 | 1,000㍓あたり500ml |
| ① ダニゲッターフロアブル | 2,000倍 | ダニ | 1,000㍓あたり500ml |
| ② パスポート顆粒水和剤 | 1,000倍 | 殺菌 | 1,000㍓あたり1kg |
| カルスパ | 1,000倍 | 石灰 | 1,000㍓あたり1kg |

散布期間：6月25日～6月29日

※7月は散布間隔が15日間隔となるため、固着性展着剤アビオンE2,000倍を必ず加用をしてください。加用することで薬剤の効果維持を保つことが期待できます。加用する場合は最初に入れて下さい。

一般栽培

定期防除 第8回防除について

散布量：全体系 10a当り 550㍓

【一般体系】

- | | | | |
|---------------|--------|----|----------------|
| ① ダニゲッターフロアブル | 2,000倍 | ダニ | 1,000㍓あたり500ml |
| ② パスポート顆粒水和剤 | 1,000倍 | 殺菌 | 1,000㍓あたり1kg |
| ③ スミチオン水和剤40 | 1,000倍 | 殺虫 | 1,000㍓あたり1kg |

散布期間：6月25日～6月29日

※長雨が懸念される場合は、対策としてアビオンE2,000倍の加用を検討しましょう。

一般栽培

定期防除 第9回防除について

散布量：全体系 10a当り 550㍓

【一般体系】

- ① サイアノックス水和剤 1,000倍 殺虫 1,000㍓あたり1kg
- ② オキシラン水和剤 500倍 殺菌 1,000㍓あたり2kg
- ③ ユニックス顆粒水和剤 47,2,000倍 殺菌 1,000㍓あたり500g

散布期間：7月5日～7月10日

※近年、褐斑病の発生が見られない園地ではユニックス顆粒水和剤 47 を省略できます。その際はカルスパの混用を検討してください。

今回の防除ポイント

●ダニゲッターフロアブルは、日本なしの新葉に薬害が発生する恐れがあるので、日本なしへ使用しないように注意してください。

●パスポート顆粒水和剤の収穫前規制が45日となっております。

「紅ロマン」の作付がある園地では収穫前規制に注意が必要です。

昨年の収穫は8月17日前後となっております。

例) 6月29日散布で8月13日から収穫可能です。

(注) りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。

※腐らん病は確認したならすぐにせん除、削り取り等、適切に処置して下さい。

次回予察会議：令和4年7月6日(水)

※ 農作業事故には十分注意し作業を行ってください。



J A いわて中央

各地域園芸特産課 または
園芸推進課(担当：横澤)

TEL : 673-7485

FAX : 673-7636