

7月6日に開催された「りんご防除予察会議」の内容についてご連絡いたします。

特別栽培 定期防除 第9回防除について

散布量：全体系 10a当り 550ℓ

【特別栽培1型・2型共通】

- | | | | |
|---------------|--------|----|----------------|
| アビオンE | 2,000倍 | 展着 | 1,000ℓあたり500ml |
| ① スカウトフロアブル | 2,000倍 | 殺虫 | 1,000ℓあたり500ml |
| ② オキシンドー水和剤80 | 1,200倍 | 殺菌 | 1,000ℓあたり833g |
| カルスパ | 1,000倍 | 石灰 | 1,000ℓあたり1kg |

散布期間：7月11日～7月16日

※7月は散布間隔が15日間隔となるため、固着性展着剤アビオンE 2,000倍を必ず加用をしてください。

※斑点落葉病、褐斑病が心配される園地ではポリオキシシンAL水和剤 1,000倍を特散してください。その際はカルスパを抜いて混合してください。

一般栽培 定期防除 第10回防除について

散布量：全体系 10a当り 550ℓ

【一般体系】

- | | | | |
|--------------|--------|----|---------------|
| ① スタークル顆粒水和剤 | 2,000倍 | 殺虫 | 1,000ℓあたり500g |
| ② ダイパワー水和剤 | 1,000倍 | 殺菌 | 1,000ℓあたり1kg |
| ③ カルスパ | 1,000倍 | 石灰 | 1,000ℓあたり1kg |

散布期間：7月15日～7月20日

※繰り返し散布等4種混合になる場合はカルスパを除いて混合するようにしてください。

今回の防除ポイント

- 徒長枝が立って来ると薬剤の通りが悪くなり、病害虫が発生して来るので、摘果作業と合わせて不要な徒長枝の整理作業を行いましょう。
(注) りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。

次回予察会議：令和4年7月20日(水)

※ 農作業事故には十分注意し作業を行ってください。



J A いわて 中央

各地域園芸特産課 または
園芸推進課(担当：横澤)

TEL：673-7485

FAX：673-7636