

7月20日に開催された「りんご防除予察会議」の内容についてご連絡いたします。

特別栽培

定期防除 第10回防除について

散布量：全体系 10a当り 550㍓

【特別栽培1型・2型共通】

- | | | | |
|---------------|--------|----|----------------|
| ① コロマイト乳剤 | 1,000倍 | ダニ | 1,000㍓あたり1㍓ |
| ② フリントフロアブル25 | 2,000倍 | 殺菌 | 1,000㍓あたり500ml |
| カルスパ | 1,000倍 | 石灰 | 1,000㍓あたり1kg |

散布期間：7月26日～7月31日

※コロマイト乳剤は高温、乾燥時に散布すると薬害が発生することがあります。できるだけ涼しい時間帯に散布しましょう。

一般栽培

定期防除 第11回防除について

散布量：全体系 10a当り 550㍓

【一般体系】

- | | | | |
|---------------|--------|----|----------------|
| ① コロマイト乳剤 | 1,000倍 | ダニ | 1,000㍓あたり1㍓ |
| ② フリントフロアブル25 | 2,000倍 | 殺菌 | 1,000㍓あたり500ml |
| ③ スカウトフロアブル | 2,000倍 | 殺虫 | 1,000㍓あたり500ml |

散布期間：8月2日～8月7日

※前年コロマイト乳剤を散布した場合は、ダニ剤をマイトコーネフロアブル 1,000倍に変更してください。

(必ず前年の散布実績を確認すること)

一般栽培

定期防除 第12回防除について

散布量：全体系 10a当り 550ℓ

【一般体系】

① ベフラン液剤 25 1,500倍 殺菌 1,000ℓあたり 666ml

散布期間：8月12日～8月17日

※ダニ剤を繰り下げた場合はベフラン液剤 25 を最後に加えて速やかに散布を実施して下さい。

今回の防除ポイント

●この時期における殺ダニ剤散布の防除水準は寄生葉率30%となります。園地のダニの発生状況を良く確認し、散布むらが無いように丁寧に散布して下さい。

※ りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意して下さい。

※ 農作業事故には十分注意し作業を行ってください。



次回予察会議：令和4年8月12日（金）

J A いわて中央 各地域営農センター園芸特産課までお問い合わせください