

4月4日に開催された「りんご防除予察会議」の内容についてご連絡いたします。

全体系共通

芽出し 10 日後(展葉期)防除について

今年度は記録的な生育の早さと、降雨予報の状況を考え、芽出し 10 日後の散布を省略します。今後の散布は下記の「第 1 回防除について」を参考に計画を立ててください。

特別栽培

定期防除 第 1 回防除について(開花7~10 日前)

散布量：全体系 10a 当り 400ℓ

【特別栽培 1 型・2 型共通】

① スコア顆粒水和剤 3,000倍 殺菌 1,000ℓあたり 333g

散布期間：4月8日~12日

※リンゴハダニ対策でハーベストオイルを散布する場合は単剤散布をしてください。(スコア顆粒水和剤との混用の事例がありません)

単剤散布する場合スケジュールの具体例は以下の通りです。

例：4月5~6日→ハーベストオイル 200倍

4月8~10日→スコア顆粒水和剤 3,000倍



一般栽培

定期防除 第1回防除について(開花7~10日前)

散布量：全体系 10a当り 400ℓ

【一般体系】

- | | | | |
|----------------|--------|----|----------------|
| ① スコア顆粒水和剤 | 3,000倍 | 殺菌 | 1,000ℓあたり 333g |
| ② ダイアジノン水和剤 34 | 1,000倍 | 殺虫 | 1,000ℓあたり 1kg |

散布期間：4月8日~12日

※リンゴハダニ対策でハーベストオイルを散布する場合は単剤散布をしてください。(スコア顆粒水和剤との混用の事例がありません)

単剤散布する場合スケジュールの具体例は以下の通りです。

例：4月5~6日→ハーベストオイル 200倍

4月8~10日→スコア顆粒水和剤 3,000倍

ダイアジノン顆粒水和剤 1,000倍

※今回の防除ポイント

黒星病の早期感染時期(果実がく片、果そう葉裏側)になります。降雨があった場合は、降雨直後の散布で効果が高くなります。天気予報を確認し、散布計画を立てましょう。また、前年病害虫多発園では落葉の除去やすき込みなど耕種的防除にも努めましょう。

(注) りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。

(注) 農作業事故には十分注意し作業を行ってください。

次回予察会議：令和5年4月14日(金)

J A いわて中央 園芸推進課(担当：横澤) TEL：673-7485 FAX：673-7636
または各地域園芸特産課