

4月24日の予察を基に検討を行った内容についてご連絡いたします。

ミツバチ回収について（お願い）

※ミツバチ回収前の農薬散布は行わないで下さい。また、回収日が朝に当たる地域では朝4時30分～7時まで摘花剤の散布も行わないで下さい。

詳しくは、「ミツバチ回収予定」のページをご覧ください

定期防除 第3回(落花期)防除について

散布量：全体系 10a当り 450㍓

【特別栽培1型・2型共通】

- ① バイオマックスDF 3,000倍 殺虫 1,000㍓あたり 333g
- ② デランフロアブル 2,000倍 殺菌 1,000㍓あたり 500ml

散布期間：4月27日～5月1日

※散布期間内でも蜜蜂回収前は個人散布であっても散布禁止です。必ず回収日を確認すること。

【一般体系】

- ① フェニックスフロアブル 4,000倍 殺虫 1,000㍓あたり 250ml
- ② デランフロアブル 2,000倍 殺菌 1,000㍓あたり 500ml

散布期間：4月27日～5月1日

※散布期間内でも蜜蜂回収前は個人散布であっても散布禁止です。必ず回収日を確認すること。

定期防除 第4回(落花10日後)防除について

散布量：全体系 10a当り 450ℓ

【特別栽培1型・2型共通】

① ペンコゼブ水和剤,またはジマンダイセン水和剤

600倍 殺菌 1,000ℓ あたり 1.67kg

② マブリック水和剤 20 2,000倍 殺虫 1,000ℓ あたり 500g

散布期間：次回予察会議で決定

【一般体系】

① ペンコゼブ水和剤,またはジマンダイセン水和剤

600倍 殺菌 1,000ℓ あたり 1.67kg

② マブリック水和剤 20 2,000倍 殺虫 1,000ℓ あたり 500g

散布期間：次回予察会議で決定

今回の防除ポイント

第3回（落花期）定期散布は前回散布日より10日後を目安に間隔が開き過ぎないことがポイントですが、蜜蜂回収日も確認して防除をお願いします。また、りんご重要病害のモニリア病、黒星病、赤星病、褐斑病などの重点防除時期に入りますので第3回以降も間隔が開かないように散布して下さい。

（注）りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。

※腐らん病は確認したならすぐにせん除、削り取り等、適切に処置して下さい。

次回予察会議：令和5年5月2日（火）

※ 農作業事故には十分注意し作業を行ってください。

※ 不明な点がございましたらご連絡ください。



J A いわて中央

紫波：TEL676-3490

矢巾：TEL697-6211

都南：TEL638-0011

盛岡：TEL656-3700

本所：TEL673-7485