

4月14日に開催された「りんご防除予察会議」の内容についてご連絡いたします。

## ミツバチ導入について（お願い）

詳しくは「ミツバチ導入予定」のページをご覧ください

### ミツバチ導入についての注意点

ミツバチ設置期間は概ね6日間程度を予定。設置期間中、農薬（除草剤、石灰硫黄合剤を含む）散布は行わない事。（帰巢出来ず死滅する恐れがあります。）  
ミツバチを借用していない方でも事故防止のためミツバチ設置期間中の農薬散布は絶対に行わないで下さい。設置前に散布ができなかった場合はJAに連絡をしてください。（自己判断での散布は厳禁！）

※除草剤の散布を行なう方は、ミツバチ導入3日前までに終わらせてください。

※ミツバチの配布期日、設置期間は天候により変更になることもあります。

### 特別栽培

#### 定期防除 第2回防除について(開花直前)

散布量：全体系 10a当り 400㍓

##### 【特別栽培1型・2型共通】

- |             |        |    |                 |
|-------------|--------|----|-----------------|
| ① カナメフロアブル  | 4,000倍 | 殺菌 | 1,000㍓あたり 250ml |
| ② バイオマックスDF | 3,000倍 | 殺虫 | 1,000㍓あたり 333g  |

散布期間：4月16日～20日（蜜蜂導入前厳守）

### 一般栽培

#### 定期防除 第2回防除について(開花直前)

散布量：全体系 10a当り 400㍓

##### 【一般体系】

- |            |        |    |                 |
|------------|--------|----|-----------------|
| ① カナメフロアブル | 4,000倍 | 殺菌 | 1,000㍓あたり 250ml |
|------------|--------|----|-----------------|

散布期間：4月16日～20日（蜜蜂導入前厳守）

## 特別栽培

### 定期防除 第3回防除について(落花期)

散布量：全体系 10a当り 450㍓

#### 【特別栽培1型・2型共通】

- |             |        |    |                 |
|-------------|--------|----|-----------------|
| ① デランフロアブル  | 2,000倍 | 殺菌 | 1,000㍓あたり 500ml |
| ② バイオマックスDF | 3,000倍 | 殺虫 | 1,000㍓あたり 333g  |

散布期間：次回検討

## 一般栽培

### 定期防除 第3回防除について(落花期)

散布量：全体系 10a当り 450㍓

#### 【一般体系】

- |               |        |    |                 |
|---------------|--------|----|-----------------|
| ① フェニックスフロアブル | 4,000倍 | 殺虫 | 1,000㍓あたり 250   |
| ② デランフロアブル    | 2,000倍 | 殺菌 | 1,000㍓あたり 500ml |

散布期間：次回検討

#### 【腐らん病防除について】

これから、枝腐らんの発生が目立ってきます。確認したならすぐにせん除し、感染源を絶って下さい。病患部をそのまま放置すると柄胞子を飛散し重要な感染源になるので病患部は発見しだいせん除、削り取り等、適切に処置していただくようお願いいたします。

#### ※今回の防除ポイント

第2回定期防除の殺菌剤は、降雨後の散布で効果が高いです。(日降水量5mm以上目安)また、散布量や散布ルートの見直しを行い、散布ムラが発生しないように注意しましょう。

(注) りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。

(注) 農作業事故には十分注意し作業を行ってください。

**次回予察会議：令和5年4月24日(月)**

※ 不明な点がございましたらご連絡ください。



J Aいわて中央 園芸特産課  
または 本所園芸推進課 まで