

5月15日の予察を基に検討を行った内容についてご連絡いたします。

## 定期防除 第5回(落花20日後)防除について

散布量：全体系 10a当り 550㍓

### 【特別栽培1型・2型共通】

① アントラコール顆粒水和剤 500倍 殺菌 1,000㍓あたり2kg

散布期間：5月20日～5月25日

※特裁1型は、除草剤は1回しか使用できません

※特裁2型は、ミクロデナポン水和剤は使用できません

### 【一般体系】

① アントラコール顆粒水和剤 500倍 殺菌 1,000㍓あたり2kg

散布期間：5月20日～5月25日

## 今回の防除ポイント

サビに注意が必要な時期なので薬剤が乾く時間帯の散布がポイントです。薬液の乾きづらい夕方散布はサビのリスクが高くなります。果面保護を目的としてクレミクス、バイカルティの加用も検討しましょう。また腐らん病の処理はこの時期までに済ませるようにしましょう。

## 定期防除 第6回(追加散布)防除について

散布量：全体系 10a当り 550ℓ

【特別栽培1型・2型共通】

①ペンコゼブ水和剤,またはジマンダイセン水和剤

600倍 殺菌 1,000ℓあたり 1.67kg

散布期間：6月1日～6月5日

【一般体系】

①ペンコゼブ水和剤,またはジマンダイセン水和剤

600倍 殺菌 1,000ℓあたり 1.67kg

散布期間：6月1日～6月5日

### 今回の防除ポイント

キンモンホソガ第1世代羽化盛期の予測が6月13日となっており、その時期までの散布間隔が開くことが予想されます。褐斑病や炭疽病など主要病害の重点防除時期となりますので上記殺菌剤の追加防除を検討しましょう。

次回予察会議：令和5年6月7日（水）

※ 農作業事故には十分注意し作業を行ってください。

※ 不明な点がございましたらご連絡ください。



J A いわて中央 紫波：TEL676-3490 矢巾：TEL697-6211  
都南：TEL638-0011 盛岡：TEL656-3700 本所：TEL673-7485