

6月7日に開催された「りんご防除予察会議」の内容についてご連絡いたします。

定期防除 第7回防除について

散布量：全体系 10a当り 550㍓

【特別栽培1型・2型共通】

- ① モスピラン顆粒水溶剤 4,000倍 殺虫 1,000㍓あたり250g
- ② チオノックフロアブル 500倍 殺菌 1,000㍓あたり2㍓

散布期間：6月10日～6月14日

※ダニの発生が確認されたなら粘着くん水和剤 500倍を特別散布する。

【一般体系】

- ① モスピラン顆粒水溶剤 4,000倍 殺虫 1,000㍓あたり250g
- ② ラビライト水和剤 600倍 殺菌 1,000㍓あたり1.67kg

散布期間：6月10日～6月14日

※ダニの発生が確認されたならアカリタッチ乳剤 3,000倍を特別散布する。

今回の防除ポイント

第7回定期散布はキンモンホソガの発生に合わせた散布期間となっております。キンモンホソガの散布適期は羽化盛期の5日前後となっております。今年度は6月6日～6月16日頃と推測されます。またダニの発生が目立ち始める時期になります。園地を良く観察しましょう。

(注) りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。

※腐らん病は確認したならすぐにせん除、削り取り等、適切に処置して下さい。

次回予察会議：令和5年6月22日（木）

※ 農作業事故には十分注意し作業を行ってください。



J Aいわて中央 紫波：TEL676-3490 矢巾：TEL697-6211
都南：TEL638-0011 盛岡：TEL656-3700 本所：TEL673-7485