

7月24日に開催された「りんご防除予察会議」の内容についてご連絡いたします。

特別栽培 定期防除 第10回防除について

散布量：全体系 10a当り 550㍓

【特別栽培1型・2型共通】

- | | | | |
|---------------|--------|----|----------------|
| ① コロマイト乳剤 | 1,000倍 | ダニ | 1,000㍓あたり1㍓ |
| ② フリントフロアブル25 | 2,000倍 | 殺菌 | 1,000㍓あたり500ml |
| カルスパ | 1,000倍 | 石灰 | 1,000㍓あたり1kg |

散布期間：7月26日～7月31日

※コロマイト乳剤は高温、乾燥時に散布すると薬害が発生することがあります。できるだけ涼しい時間帯に散布しましょう。

一般栽培 定期防除 第11回防除について

散布量：全体系 10a当り 550㍓

【一般体系】

- | | | | |
|---------------|--------|----|----------------|
| ① カネマイトフロアブル | 1,000倍 | ダニ | 1,000㍓あたり1㍓ |
| ② フリントフロアブル25 | 2,000倍 | 殺菌 | 1,000㍓あたり500ml |
| ③ サムコルフロアブル | 5,000倍 | 殺虫 | 1,000㍓あたり200ml |

散布期間：7月31日～8月5日

一般栽培 定期防除 第12回防除について

【一般体系】

- | | | | |
|------------|--------|----|----------------|
| ① ベフラン液剤25 | 1,500倍 | 殺菌 | 1,000㍓あたり666ml |
|------------|--------|----|----------------|

散布期間：8月10日～8月14日

※ダニ剤を繰り下げた場合はベフラン液剤25を最後に加えて速やかに散布を実施して下さい。

今回の防除ポイント

●この時期における殺ダニ剤散布の防除水準は寄生葉率30%となります。園地のダニの発生状況を良く確認し、散布むらが無いように丁寧に散布してください。

次回予察会議：令和5年8月9日（水）

※ 農作業事故には十分注意し作業を行ってください。



J Aいわて中央 紫波：TEL676-3490 矢巾：TEL697-6211
都南：TEL638-0011 盛岡：TEL656-3700 本所：TEL673-7485