

7月7日に開催された「りんご防除予察会議」の内容についてご連絡いたします。

特別栽培 定期防除 第9回防除について

散布量：全体系 10a当り 550㍓

【特別栽培1型・2型共通】

アビオンE	2,000倍	展着	1,000㍓あたり500ml
①サムコルフロアブル10	5,000倍	殺虫	1,000㍓あたり200ml
②オキシンドー水和剤80	1,200倍	殺菌	1,000㍓あたり833g
カルスパ	1,000倍	石灰	1,000㍓あたり1kg

散布期間：7月11日～7月16日

※7月は散布間隔が15日間隔となるため、固着性展着剤アビオンE 2,000倍を必ず加用をしてください。加用することで薬剤の効果維持を保つことが期待できます。加用する場合は最初に入れて下さい。
※斑点落葉病、褐斑病が心配される園地ではポリオキシシンAL水和剤 1,000倍を特散してください。その際はカルスパを抜いて混合してください。

一般栽培 定期防除 第10回防除について

散布量：全体系 10a当り 550㍓

【一般体系】

①スタークル顆粒水和剤	2,000倍	殺虫	1,000㍓あたり500g
②ダイパワー水和剤	1,000倍	殺菌	1,000㍓あたり1kg
③カルスパ	1,000倍	石灰	1,000㍓あたり1kg

散布期間：7月16日～7月20日

今回の防除ポイント

●徒長枝が立って来ると薬剤の通りが悪くなり、病害虫が発生して来るので、摘果作業と合わせて不要な徒長枝の整理作業を行いましょう。

次回予察会議：令和5年7月24日（月）

※ 農作業事故には十分注意し作業を行ってください。



J Aいわて中央 紫波：TEL676-3490 矢巾：TEL697-6211
都南：TEL638-0011 盛岡：TEL656-3700 本所：TEL673-7485