

4月8日に開催された「りんご防除予察会議」の内容についてご連絡いたします。

定期防除 第1回防除について（展葉期）

特別栽培

散布量：10a当り 300ℓ

①ハーベストオイル 100倍 ダニ 1,000ℓあたり10ℓ

散布期間：4月12日～15日

※展葉期は葉が1～2枚開いた時期を目安とする。

※芽出し前に50倍で散布した場合は省略する。

一般栽培

散布量：10a当り 300ℓ

①ハーベストオイル 100倍 ダニ 1,000ℓあたり10ℓ

②ダイアジノン水和剤34 1,000倍 殺虫 1,000ℓあたり1kg

散布期間：4月12日～15日

※展葉期は葉が1～2枚開いた時期を目安とする。

※芽出し前に50倍で散布した場合は省略する。

※腐らん病の発生が多い園地では、ベフラン液剤25を1,000倍の散布検討をする。

※今回の防除ポイント

盛岡地方の展葉予想日は4月13日となっております。自園地を確認し、生育にあわせて散布計画を立てましょう。

（注）りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。

（注）農作業事故には十分注意し作業を行ってください。

次回予察会議：令和6年4月16日（火）

J A いわて中央 紫波：TEL676-3490 矢巾：TEL697-6211
都南：TEL638-0011 盛岡：TEL656-3700 本所：TEL673-7485