

4月16日に開催された「りんご防除予察会議」の内容についてご連絡いたします。

定期防除 第2回(開花7~10日前)防除について

散布量：全体系 10a当り 400ℓ

特別栽培

①カナメフロアブル 4,000倍 殺菌 1,000ℓあたり250ml

散布期間：4月18日~4月21日

一般栽培

①カナメフロアブル 4,000倍 殺菌 1,000ℓあたり250ml

散布期間：4月18日~4月21日

定期防除 第3回(開花直前)防除について

散布量：全体系 10a当り 400ℓ

特別栽培

①オンリーワンフロアブル 2,000倍 殺菌 1,000ℓあたり500ml

②バイオマックスDF 3,000倍 殺虫 1,000ℓあたり333g

散布期間：4月24日~4月27日

一般栽培

①ミギワ20フロアブル 4,000倍 殺菌 1,000ℓあたり250ml

散布期間：4月24日~4月27日

※ 褐斑病の発生が見られる園地については、オンリーワンフロアブル 2,000倍を加用する。

※今回の防除ポイント

【腐らん病防除について】

これから、枝腐らんの発生が目立ってきます。確認したならすぐにせん除し、感染源を絶って下さい。病患部をそのまま放置すると柄胞子を飛散し重要な感染源になるので病患部は発見しだいせん除、削り取り等、適切に処置していただくようお願いします。

※今回の防除ポイント

第2回定期防除の殺菌剤は、降雨後の散布で効果が高いです。（日降水量 5 mm以上目安）また、散布量や散布ルートの見直しを行い、散布ムラが発生しないように注意しましょう。また、りんご重要病害のモニリア病、黒星病、黒点病、褐斑病などの重点防除時期に入りますので第3回以降も間隔が開かないように散布して下さい。

（注） りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。

次回予察会議:令和6年5月1日(水)

※ 農作業事故には十分注意し作業を行ってください。

※ 不明な点がございましたらご連絡ください。

J A いわて中央 紫波 : TEL 676-3490 矢巾 : TEL 697-6211

都南 : TEL 638-0011 盛岡 : TEL 656-3700 本所 : TEL 673-7485