

3月27日に開催された「りんご防除予察会議」の内容についてご連絡いたします。

## 特別散布 芽出し前防除について

### 全体系共通

散布量：10a当り 300ℓ

①ハーベストオイル 50倍 ダニ 1,000ℓあたり20ℓ

散布期間：3月28日～4月1日

※散布期間は芽出し前から芽出し直後までに散布する。それ以降に同倍率で散布すると薬害の恐れがあるので注意する。

※近年リンゴハダニ、ナシマルカイガラムシの発生が増えているので、散布に努める。

## 定期防除 第1回防除について(展葉期)

### 特別栽培

散布量：10a当り 300ℓ

【特別栽培1型・2型共通】

①ハーベストオイル 100倍 ダニ 1,000ℓあたり10ℓ

散布期間：4月10日～14日

※展葉期は葉が1～2枚開いた時期を目安とする。

※芽出し前に50倍で散布した場合は省力する。

# 定期防除 第1回防除について(展葉期)

## 一般栽培

散布量：10a当り 300ℓ

### 【特別栽培1型・2型共通】

- |              |        |    |              |
|--------------|--------|----|--------------|
| ①ハーベストオイル    | 100倍   | ダニ | 1,000ℓあたり10ℓ |
| ②ダイアジノン水和剤34 | 1,000倍 | 殺虫 | 1,000ℓあたり1kg |

散布期間：4月10日～14日

※展葉期は葉が1～2枚開いた時期を目安とする。

※芽出し前に50倍で散布した場合は省力する。

※腐らん病の発生が多い園地では、ベフラン液剤25を1,000倍の散布検討をする。

## ※今回の防除ポイント

リンゴハダニ越冬卵の防除期となります。枝の分岐部（小枝の分かれ目）などを観察し、赤色の卵があるか確認しましょう。また昨年カイガラムシ被害が多い園地では確実に散布するようにしましょう。

（注）りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。

（注）農作業事故には十分注意し作業を行ってください。

次回予察会議：令和6年4月8日（月）

J A いわて中央 紫波：TEL676-3490 矢巾：TEL697-6211  
都南：TEL638-0011 盛岡：TEL656-3700 本所：TEL673-7485