

5月1日の予察を基に検討を行った内容についてご連絡いたします。

ミツバチ回収について（お願い）

※ミツバチ回収前の農薬散布は行わないで下さい。

また、回収日が朝に当たる地域では朝4時30分～7時までカルスパの散布も行わないで下さい。

詳しくは「令和6年度ミツバチ回収予定表」を
ご覧ください

定期防除 第4回(落花期)防除について

散布量：全体系 10a当り 450ℓ

【特別栽培】

① デランフロアブル 2,000倍 殺菌 1,000ℓあたり500ml

散布期間：5月4日～5月8日

※散布期間内でも蜜蜂回収前は個人散布であっても散布禁止です。必ず回収日を確認すること。

※ダニの発生が確認されたなら粘着くん水和剤500倍の散布を検討する。

【一般栽培】

- ① フェニックスフロアブル4,000倍 殺虫 1,000ℓあたり 250ml
② デランフロアブル 2,000倍 殺菌 1,000ℓあたり 500ml

散布期間：5月4日～5月8日

※散布期間内でも蜜蜂回収前は個人散布であっても散布禁止です。必ず回収日を確認すること。

※ダニの発生が確認されたならアカリタッチ乳剤 3000 倍の散布を検討する。

※前年黒星病が多発した園地は殺菌剤をブローダ水和剤 800 倍へ変更を検討する。判断に迷う場合は農協へ相談する。

今回の防除ポイント

第4回（落花期）定期散布は前回散布日より10日後を目安に間隔が開き過ぎないことがポイントですが、蜜蜂回収日も確認して防除をお願いします。また、りんご重要病害のモニリア病、黒星病、赤星病、褐斑病などの重点防除時期に入りますので第5回以降も間隔が開かないように散布して下さい。

（注）りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。
※腐らん病は確認したならすぐにせん除、削り取り等、適切に処置して下さい。

次回予察会議：令和6年5月10日（金）

- ※ 農作業事故には十分注意し作業を行ってください。
- ※ 不明な点がございましたらご連絡ください。



J A いわて中央 紫波：TEL676-3490 矢巾：TEL697-6211
都南：TEL638-0011 盛岡：TEL656-3700 本所：TEL673-7485