

6月24日の予察を基に検討を行った内容についてご連絡いたします。

定期防除 第8回防除について

散布量：全体系 10a当り 550㍓

特別栽培

- | | | | | |
|--------------|--------|----|-----------|-------|
| アビオンE | 2,000倍 | 展着 | 1,000㍓あたり | 500ml |
| ①ダニゲッターフロアブル | 2,000倍 | ダニ | 1,000㍓あたり | 500ml |
| ②パスポート顆粒水和剤 | 1,000倍 | 殺菌 | 1,000㍓あたり | 1kg |
| ③カルスパ | 1,000倍 | 石灰 | 1,000㍓あたり | 1kg |

散布期間：6月27日～7月1日

※7月は散布間隔が15日間隔となるため、固着性展着剤アビオンE 2,000倍を必ず加用をしてください。加用することで薬剤の効果維持を保つことが期待できます。加用する場合は最初に入れて下さい。

一般栽培

- | | | | | |
|--------------|--------|----|-----------|-------|
| ①ダニゲッターフロアブル | 2,000倍 | ダニ | 1,000㍓あたり | 500ml |
| ②パスポート顆粒水和剤 | 1,000倍 | 殺菌 | 1,000㍓あたり | 1kg |
| ③スミチオン水和剤40 | 1,000倍 | 殺虫 | 1,000㍓あたり | 1kg |

散布期間：6月27日～7月1日

※長雨が懸念される場合は、対策としてアビオンE 2,000倍の加用を検討しましょう。

※パスポート顆粒水和剤の収穫前規制が懸念される場合は殺菌剤をチオノックフロアブル 500倍に変更してください。

定期防除 第9回防除について

散布量：全体系 10a当り 550ℓ

一般栽培

- ①サイアノックス水和剤 1,000倍 殺虫 1,000ℓあたり1kg
- ②オキシラン水和剤 500倍 殺菌 1,000ℓあたり2kg
- ③カルスパ 1,000倍 石灰 1,000ℓあたり1kg

散布期間：7月7日～7月11日

※長雨が懸念される場合は、対策としてアビオンE 2,000倍の加用を検討しましょう。

今回の防除ポイント

●ダニゲッターフロアブルは成虫に対しての効果は低いので発生密度が上がる前に、遅れずに防除をしましょう。ダニの発生が気にならない場合は繰り下げての散布も可能ですが、必ず自園地の発生状況を確認し、散布スケジュールを検討してください。

●パスポート顆粒水和剤の収穫前規制が45日となっております。

「紅ロマン」の作付がある園地では収穫前規制に注意が必要です。今年度産は収穫期が早まる可能性があります。「紅ロマン」を含む、お盆前に収穫する品種は注意しましょう。

例) 7月1日散布で8月15日から収穫可能です。

(注) りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。
※腐らん病は確認したならすぐにせん除、削り取り等、適切に処置して下さい。

次回予察会議：令和6年7月10日(水)

J A いわて中央 紫波：TEL676-3490 矢巾：TEL697-6211
都南：TEL638-0011 盛岡：TEL656-3700 本所：TEL673-7485

