

5月31日の予察を基に検討を行った内容についてご連絡いたします。

訂正

定期防除 第7回防除について

散布量：全体系 10a 当り 550ℓ

特別栽培

- ① モスピラン顆粒水溶剤 4,000倍 殺虫 1,000ℓ あたり 250g
- ② ジマンダイセン水和剤 600倍 殺菌 1,000ℓ あたり 1.67kg
(ペンコゼブ水和剤でも可)

散布期間：6月2日～6月7日

※ダニの発生が確認されたなら粘着くん水和剤 500 倍を特別散布する。

一般栽培

- ① モスピラン顆粒水溶剤 4,000倍 殺虫 1,000ℓ あたり 250g
- ② ジマンダイセン水和剤 600倍 殺菌 1,000ℓ あたり 1.67kg
(ペンコゼブ水和剤でも可)

散布期間：6月2日～6月7日

※ダニの発生が確認されたならアカリタッチ乳剤 3,000 倍を特別散布する。

今回の防除ポイント

第7回定期散布はキンモンホソガの発生に合わせた散布期間となっております。キンモンホソガの散布適期は羽化盛期の5日前後となっております。今年度は5月29日～6月8日頃と推測されます。またダニの発生が目立ち始める時期になります。園地を良く観察しましょう。

(注) りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。
※腐らん病は確認したならすぐにせん除、削り取り等、適切に処置して下さい。

次回予察会議：令和6年6月24日(月)

追加散布について

散布量：全体系 10a当り 550ℓ

特別栽培

- ①ジマンダイセン水和剤 600倍 殺菌 1,000ℓあたり 1.67kg
(ペンコゼブ水和剤でも可)

散布期間：6月12日～6月16日

一般栽培

- ①ジマンダイセン水和剤 600倍 殺菌 1,000ℓあたり 1.67kg
(ペンコゼブ水和剤でも可)
- ②ユニックス顆粒水和剤 2,000倍 殺菌 1,000ℓあたり 500g

散布期間：6月12日～6月16日

今回の防除ポイント

第7回定期散布はキンモンホソガの発生に合わせた散布期間となっており、定期散布の時期がかなり早まっております。次回の定期散布との間隔を考慮して上記殺菌剤の追加防除を検討しましょう。

(注) りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。
※腐らん病は確認したならすぐにせん除、削り取り等、適切に処置して下さい。

J Aいわて中央 紫波：TEL676-3490 矢巾：TEL697-6211
都南：TEL638-0011 盛岡：TEL656-3700 本所：TEL673-7485

