

7月10日の予察を基に検討を行った内容についてご連絡いたします。

特別栽培 **定期防除 第9回防除について**

散布量：全体系 10a当り 550ℓ

アピオンE	2,000倍	展着	1,000ℓあたり	500ml
①アーデントフロアブル	2,000倍	殺虫	1,000ℓあたり	500ml
②オキシンドー水和剤80	1,200倍	殺菌	1,000ℓあたり	833g
③カルスパ	1,000倍	石灰	1,000ℓあたり	1kg

散布期間：7月12日～7月16日

※7月は散布間隔が15日間隔となるため、固着性展着剤アピオンE2,000倍を必ず加用してください。加用することで薬剤の効果維持を保つことが期待できます。加用する場合は最初に入れてください。

※斑点落葉病・褐斑病が心配される園地では、ポリオキシソール水和剤1,000倍を特散してください。

一般栽培 定期防除 第10回防除について

散布量：全体系 10a 当り 550ℓ

- | | | | |
|-------------|--------|----|---------------|
| ①スタークル顆粒水溶剤 | 2,000倍 | 殺虫 | 1,000ℓあたり500g |
| ②ダイパワー水和剤 | 1,000倍 | 殺菌 | 1,000ℓあたり1kg |
| ③カルスパ | 1,000倍 | 石灰 | 1,000ℓあたり1kg |

散布期間：7月17日～7月21日

※長雨が懸念される場合は、対策としてアビオンE2,000倍の加用を検討しましょう。

今回の防除ポイント

●徒長枝が立って来ると薬剤の通りが悪くなります。再度園地を確認しましょう。今年度は褐斑病の発生が早まっております。昨年多発した園地は注意が必要ですのでJAまでご相談ください。また、ダニの発生が見られてきました。次回、ダニ剤散布前に多く見られる場合もご相談ください。

次回予察会議：令和6年7月24日（水）

JAいわて中央	紫波：TEL676-3490	矢巾：TEL697-6211
都南：TEL638-0011	盛岡：TEL656-3700	本所：TEL673-7485

