

8月9日の予察を基に検討を行った内容についてご連絡いたします。

特別栽培 定期防除 第11回防除について

散布量：全体系 10a当り 550㍓

- ① フェニックスフロアブル 4,000倍 殺虫 1,000㍓あたり 250ml
- ② ストライド顆粒水和剤 1,500倍 殺菌 1,000㍓あたり 666g

散布期間：8月16日～8月22日

※この時期以降にダニの発生が確認された場合、JAまでご相談ください。

一般栽培 定期防除 第13回防除について

散布量：全体系 10a当り 550㍓

- ① フェニックスフロアブル 4,000倍 殺虫 1,000㍓あたり 250ml
- ② ストライド顆粒水和剤 1,500倍 殺菌 1,000㍓あたり 666g

散布期間：8月21日～8月26日

※この時期からワタムシの発生が多くみられる場合、トランスフォームフロアブル 2,000倍の散布を検討しましょう。

※9月上・中旬にダニの発生がみられる場合はオマイト水和剤 750倍を散布しましょう。

今回の防除ポイント

●早生種の収穫が始まります。軟化に注意して採り遅れのないように作業を進めましょう。また、シンクイ類に加害されやすい時期であるため、散布間隔が開かないよう天気予報を確認して計画をしましょう。

次回予察会議：令和6年9月2日（月）

JAいわて中央 紫波：TEL676-3490 矢巾：TEL697-6211
都南：TEL638-0011 盛岡：TEL656-3700 本所：TEL673-7485

