

4月15日に開催された「りんご防除予察会議」の内容についてご連絡いたします。

## 定期防除 第2回(開花7~10日前)防除について

散布量：全体系 10a当り 400ℓ

### 一般栽培

①カナメフロアブル 4,000倍 殺菌 1,000ℓあたり250ml

散布期間：4月17日~4月22日

## 定期防除 第3回(開花直前)防除について

散布量：全体系 10a当り 400ℓ

### 一般栽培

①キワミPZ水和剤 500倍 殺菌 1,000ℓあたり2kg

散布期間：4月23日~4月27日

※各地域のミツバチ導入日に注意して散布してください。

### ※今回の防除ポイント

第2回定期防除の殺菌剤は、降雨後の散布で効果が高いです。(日降水量5mm以上目安)散布量や散布ルートの見直しを行い、散布ムラが発生しないように注意しましょう。また、りんご重要病害のモニリア病、黒星病、黒点病、褐斑病などの重点防除時期に入りますので、第3回以降も間隔が開かないように散布して下さい。今年は雨が多い予報ですので黒星病の発生に注意しましょう。

#### 【腐らん病防除について】

腐らん病を確認したならすぐにせん除し、感染源を絶って下さい。病患部をそのまま放置すると柄胞子を飛散し重要な感染源になるので、病患部は発見次第せん除、削り取り等、適切に処置しましょう。

(注) りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。

## 次回予察会議:令和7年5月1日(木)

※ 農作業事故には十分注意し作業を行ってください。

※ 不明な点がございましたらご連絡ください。

J A いわて中央 紫波：TEL 676-3490 矢巾：TEL 697-6211

都南：TEL 638-0011 盛岡：TEL 656-3700 本所：TEL 673-7485