

4月7日に開催された「りんご防除予察会議」の内容についてご連絡いたします。

## 定期防除 第1回防除について(展葉期)

### 一般栽培

散布量：10a当り 300ℓ

- ①ハーベストオイル 100倍 ダニ 1,000ℓあたり 10ℓ
- ②ダイアジノン水和剤 34 1,000倍 殺虫 1,000ℓあたり 1kg

散布期間：4月10日～14日

※芽出し前にハーベストオイル50倍で散布した場合は、ハーベストオイル100倍を省略できる。

※カイガラムシ発生園地で芽出し前にハーベストオイル50倍を散布できなかった園地では、アプロードフロアブル1000倍を混用して散布する。

※腐らん病の発生が多い園地では、ベフラン液剤25を1,000倍の散布検討をする。

### ※今回の防除ポイント

- ・展葉期は葉が1～2枚開いた頃です。生育を見て散布しましょう。散布時期に迷われた方はJAまでご相談ください。
- ・リンゴハダニ越冬卵の防除期となります。枝の分岐部（小枝の分かれ目）などを観察し、赤色の卵があるか確認しましょう。
- ・近年、カイガラムシ被害が増えています。昨年被害があった園地では確実に散布するようにしましょう。

(注) りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。

(注) 農作業事故には十分注意し作業を行ってください。

### ◆次回予察会議：令和7年4月15日（火）18：00～

JAいわて中央 紫波：TEL676-3490 矢巾：TEL697-6211  
都南：TEL638-0011 盛岡：TEL656-3700 本所：TEL673-7485