

5月14日の予察を基に検討を行った内容についてご連絡いたします。

定期防除 第5回(落花10日後)防除について

散布量：全体系 10a当り 450ℓ

一般栽培

- ① デランフロアブル 2,000倍 殺菌 1,000ℓ あたり 500ml
② マブリック水和剤 20 2,000倍 殺虫 1,000ℓ あたり 500g

散布期間：5月18日～5月24日

今回の防除ポイント

第5回（落花10日後）定期散布は前回散布日より10日後を目安に間隔を空けないことがポイントです。また、サビに注意が必要な時期なので薬剤が乾く時間帯に散布するようにしましょう。（薬液の乾きづらい夕方散布はサビの発生リスクが高くなります。）果面保護を目的としてクレミクス、バイカルティの加用も検討しましょう。

（注） りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。

※腐らん病は確認したならすぐにせん除、削り取り等、適切に処置して下さい。

次回予察会議：令和7年5月26日（月）18：00～

※ 農作業事故には十分注意し作業を行ってください。

※ 不明な点がございましたらご連絡ください。

JAいわて中央 紫波：TEL676-3490 矢巾：TEL697-6211
都南：TEL638-0011 盛岡：TEL656-3700 本所：TEL673-7485

