

5月1日の予察を基に検討を行った内容についてご連絡いたします。

## ミツバチ回収について（お願い）

※ミツバチ回収前の農薬散布は行わないで下さい。また、回収日が朝に当たる地域では朝4時30分～7時までカルスパの散布も行わないで下さい。

詳しくは、「ミツバチ回収予定」のページをご覧ください

## 定期防除 第4回(落花期)防除について

散布量：全体系 10a当り 450㍓

### 【一般栽培】

① フェニックスフロアブル4,000倍 殺虫 1,000㍓あたり 250ml

② デランフロアブル 2,000倍 殺菌 1,000㍓あたり 500ml

散布期間：5月7日～5月12日

※散布期間内でもミツバチ回収前は散布禁止です。必ず回収日を確認し、ミツバチ回収後に散布してください。

※黒星病の発生が心配な場合は、スコア顆粒水和剤3000倍を混用してください。

※ダニの発生が確認されたならアカリタッチ乳剤3000倍の散布を検討する。

※特別栽培を選択している方で黒星病が心配な方は第4回防除時にイオウフロアブル500倍の混用を検討してください。

### ◆今回の防除ポイント

第4回（落花期）定期散布は前回散布日より10日後を目安に間隔が開き過ぎないことがポイントですが、ミツバチ回収日も確認して防除をお願いします。また、りんご重要病害のモニリア病、黒星病、赤星病、褐斑病などの重点防除時期に入りますので第5回以降も間隔が開かないように散布して下さい。

（注）りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。

次回予察会議：令和7年5月14日（水）

18：00～



J A いわて中央

紫波：TEL676-3490

矢巾：TEL697-6211

都南：TEL638-0011

盛岡：TEL656-3700

本所：TEL673-7485