

5月26日の予察を基に検討を行った内容についてご連絡いたします。

定期防除 第6回(落花20日後)防除について

散布量：全体系 10a当り 550㍓

【一般体系】

① アントラコール顆粒水和剤 500倍 殺菌 1,000㍓あたり 2kg

散布期間：5月29日～6月2日

◆今回の防除ポイント

第6回散布から散布量が550㍓に変更となっていますので、散布量に注意しましょう。また、この時期から炭疽病の重点防除期になります。昨年は果実病害が散見されているので、散布ムラの無いようしっかり防除しましょう。

(注) りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。
※腐らん病は確認したならすぐにせん除、削り取り等、適切に処置して下さい。

次回予察日：令和7年6月17日(火)

JAいわて中央	紫波：TEL676-3490	矢巾：TEL697-6211
都南：TEL638-0011	盛岡：TEL656-3700	本所：TEL673-7485



※今回の防除はキンモンホソガの羽化盛期に合わせたタイミングとなります。キンモンホソガの羽化について、詳しい情報が入りましたら改めてお知らせいたします。

定期防除 第7回防除について

散布量：全体系 10a 当り 550ℓ

【一般体系】

- ①モスピラン顆粒水溶剤 4,000倍 殺虫 1,000ℓ あたり 250g
- ②ジマンダイセン水和剤 600倍 殺菌 1,000ℓ あたり 1.67kg
(ペンコゼブ水和剤でも可)

散布期間：6月8日～6月12日

※ダニの発生が確認されたならアカリタッチ乳剤 3,000倍を特別散布する。

◆今回の防除ポイント

第7回定期散布はキンモンホソガの発生に合わせた散布期間となっております。キンモンホソガの散布適期は羽化盛期の5日前後となっております。今年は6月6日～6月15日頃と推測されます。またダニの発生が目立ち始める時期になります。園地を良く観察しましょう。

6月～8月の間、カルシウム剤（カルスパ 1000倍）を葉面散布すると油上がり軽減、ビターピット防止効果が期待できます。カルシウム剤は最後に混用してください。

※メーカーよりカルシウムを含め4種混合でも問題ないとの情報提供がありました。

(注) りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。
※腐らん病は確認したならすぐにせん除、削り取り等、適切に処置して下さい。

次回予察日：令和7年6月17日（火）

JAいわて中央	紫波：TEL676-3490	矢巾：TEL697-6211
都南：TEL638-0011	盛岡：TEL656-3700	本所：TEL673-7485

