7月8日の予察を基に検討を行った内容についてご連絡いたします。

定期防除 第10回防除について

散布量：全体系 10a 当り 550ℓ

一般栽培

- ① ミネクトエクストラSC 10000倍 殺虫1000ℓあたり100ml
- ② オンリーワンフロアブル 2000倍 殺菌1000ℓあたり500ml
- ③ カルスパ 1000倍 石灰1000ℓあたり1kg

散布期間：7月10日～7月14日

◆今回の防除ポイント

- ・長雨対策としてアビオンE2000倍の加用を検討してください。加用する場合は先に入れてください。
- ・今回採用の殺虫剤は昨年より販売が開始された新しい薬剤です。幅広い害虫類に効果がありますが、カブリダニ類等の天敵には優しい薬剤です。高濃度製剤のため、希釈倍率は10,000倍です。間違えないようご注意ください。

(注) りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。
※腐らん病は確認したならすぐにせん除、削り取り等、適切に処置して下さい。

次回予察会議：令和7年7月31日(木) 19:00～

J A いわて中央 紫波：TEL676-3490 矢巾：TEL697-6211
都南：TEL638-0011 盛岡：TEL656-3700 本所：TEL673-7485

7月8日の予察を基に検討を行った内容についてご連絡いたします。

定期防除 第11回防除について

散布量：全体系 10a 当り 550ℓ

一般栽培

- ① スタークル顆粒水溶剤 2000倍 殺虫1000ℓあたり500ml
- ② オキシラン水和剤 500倍 殺菌1000ℓあたり2kg
- ③ カルスパ 1000倍 石灰1000ℓあたり1kg

散布期間：7月20日～7月24日

◆今回の防除ポイント

- ・長雨対策としてアピオンE2000倍の加用を検討してください。加用する場合は先に入れてください。
- ・スタークル顆粒水溶剤はカメムシ類に対し、吸汁阻害効果と殺虫効果があります。今年はカメムシ類の発生が非常に多く、7月下旬からは今年ふ化した世代の活動も活発になることが予想されますのでしっかり薬剤がかかるよう丁寧に散布しましょう。

(注) りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。
※腐らん病は確認したならすぐにせん除、削り取り等、適切に処置して下さい。

次回予察会議：令和7年7月31日(木) 19:00～

J A いわて中央 紫波：TEL676-3490 矢巾：TEL697-6211
都南：TEL638-0011 盛岡：TEL656-3700 本所：TEL673-7485