

3月25日に開催された「りんご防除予察会議」の内容についてご連絡いたします。

定期防除 特別散布について(芽出し前)

一般栽培

散布量：10a当り 300ℓ

①ハーベストオイル 50倍 ダニ 1,000ℓあたり20ℓ

散布期間：3月26日～29日

※散布期間は芽出し前から芽出し直後までに散布する。それ以降に同倍率で散布すると薬害の恐れがあるので注意する。

※近年リンゴハダニ、ナシマルカイガラムシの発生が増えているので、散布に努める。

※今回の防除ポイント

・リンゴハダニ越冬卵の防除期となります。枝の分岐部（小枝の分かれ目）などを観察し、赤色の卵があるか確認しましょう。

◆りんご発芽予測（3/24時点）

盛岡市三ツ割 4/1頃 （前年4/5 平年4/6）

紫波町長岡 3/30頃 （前年4/5 平年4/5）

平年に比べて早まる予想です。園地を確認し、散布遅れの無いようにしましょう。

（注）りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。

（注）農作業事故には十分注意し作業を行ってください。

◆次回予察会議：令和8年4月6日（月）18：00～

J A いわて中央 紫波：TEL676-3490 矢巾：TEL697-6211
都南：TEL638-0011 盛岡：TEL656-3700 本所：TEL673-7485