

4月20日に開催された「りんご防除予察会議」の内容についてご連絡いたします。

定期防除 第2回(開花直前)防除について

散布量：全体系 10a当り 400㍓

一般栽培

①キワミPZ水和剤 500倍 殺菌 1,000ℓあたり2kg

散布期間：4月23日～4月27日

※各地域のミツバチ導入日に注意して散布してください。

定期防除 第3回(落花期)防除について

散布量：全体系 10a当り 450㍓

一般栽培

①フェニックスフロアブル 4,000倍 殺虫 1,000ℓあたり250ml

②デランフロアブル 2,000倍 殺菌 1,000ℓあたり500ml

散布期間：次回検討

今回の防除ポイント

りんご生育状況とミツバチの導入日に注意しながら散布してください。また、散布量や散布ルートの見直しを行い、散布ムラが発生しないように注意しましょう。

りんご重要病害のモニリア病、黒星病、褐斑病などの重点防除時期になりますので第2回以降も間隔が開かないように散布して下さい。

摘花剤について

今年は摘果剤がありませんので、摘花剤を積極的に利用し摘果を省力化しましょう。使用する際はミツバチの回収後に実施し、腋芽花を対象に行いましょう。

(注) りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。

次回予察会議：令和8年4月30日(木)18:00～

※ 農作業事故には十分注意し作業を行ってください。

※ 不明な点がございましたらご連絡ください。

J A いわて中央 紫波：TEL 676-3490 矢巾：TEL 697-6211

都南：TEL 638-0011 盛岡：TEL 656-3700 本所：TEL 673-7485