

4月30日に開催された「りんご防除予察会議」の内容についてご連絡いたします。

## ミツバチ回収について(お願い)

ミツバチ回収前の農薬散布は行わないでください。また、回収日が朝にあたる地域では、朝4時30分～7時はカルシウム剤の散布も行わないでください。

詳しくは「令和8年度ミツバチ回収計画」をご覧ください。

## 定期防除 第3回(落花期)防除について

散布量：全体系 10a当り 450ℓ

### 一般栽培

- ①フェニックスフロアブル 4,000倍 殺虫 1,000ℓあたり250ml
- ②デランフロアブル 2,000倍 殺菌 1,000ℓあたり500ml

散布期間：5月3日(日)～5月7日(木)

※散布期間内でも、ミツバチ回収前は個人散布を含め散布禁止です。必ず回収日を確認してください。

※ダニの発生が確認された場合は、アカリタッチ乳剤 2,000～3,000倍を特別散布してください。

### 今回の防除ポイント

第3回(落花期)の定期散布は、前回散布日より10日後を目安に実施し、間隔を開けすぎないことがポイントですが、ミツバチ回収日を必ず確認して防除をお願いいたします。

また、りんご重要病害の黒星病、赤星病、褐斑病などの重点防除時期になりますので、第3回以降も間隔が開かないように散布してください。

(注) りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。

次回予察会議：令和8年5月11日(月)18:00～

- ※ 農作業事故には十分注意し作業を行ってください。
- ※ 不明な点がございましたらご連絡ください。

J A いわて中央 紫波：TEL 676-3490 矢巾：TEL 697-6211

都南：TEL 638-0011 盛岡：TEL 656-3700 本所：TEL 673-7485