

5月28日に開催された「りんご防除予察会議」の内容についてご連絡いたします。

定期防除 第6回(落花30日後)防除について

散布量：全体系 10a当り 550ℓ

一般栽培

- ①モスピラン顆粒水溶剤 4,000倍 殺虫 1,000ℓあたり250g
- ②ジマンダイセン水和剤 600倍 殺菌 1,000ℓあたり1.67kg
(ペンコゼブ水和剤でも可)

散布期間：6月6日～6月10日

※腐らん病が気になる場合は、トップジンM水和剤1,500倍の散布を検討する。

※カメムシ類の園地飛来がある場合は、モスピラン顆粒水溶剤の倍率を2,000倍に変更する。

今回の防除ポイント

第6回定期散布は、キンモンホソガの発生に合わせた散布期間となっております。キンモンホソガの散布適期は羽化盛期の5日前後となっております。今年は6月4日～6月16日頃と推測されます。

雨が多い予報となりますので、散布間隔が空きすぎないように注意しましょう。また、ダニの発生が目立ち始める時期となります。園地をよく観察しましょう。

(注) りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。

※腐らん病は確認したならすぐにせん除、削り取り等適切に処置してください。

次回予察会議：令和8年6月11日(木)18:00～

- ※ 農作業事故には十分注意し作業を行ってください。
- ※ 不明な点がございましたらご連絡ください。

J A いわて中央 紫波：TEL 676-3490 矢巾：TEL 697-6211

都南：TEL 638-0011 盛岡：TEL 656-3700 本所：TEL 673-7485