５月１１日に開催された「りんご防除予察会議」の内容についてご連絡いたします。

定期防除　第4回（落花 10 日後）防除について

散 布 量：全体系　１０a 当り　４５０㍑

一 般 栽 培

①　デランフロアブル　　2,000 倍　殺菌 1,000ℓあたり 500 ㎖

散布期間：５月 15 日～5月 19 日

※モモチョッキリゾウムシが気になる場合は、マブリック水和剤２０の2,000 倍を加用してください。

今回の防除ポイント

第４回（落花 10 日後）定期散布は前回散布日より 10 日後を目安に間隔を開けないことがポイントです。また、サビに注意が必要な時期となります。**薬剤が乾きにくい夕方散布はサビの発生リスクが高くなります**ので、薬剤が乾く時間帯に散布しましょう。

果面保護を目的として、クレミクスかバイカルティの加用も検討しましょう。

（注）　りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。

次回予察会議：令和8年5月21日(木)18：00～

※　農作業事故には十分注意し作業を行ってください。
※　不明な点がございましたならご連絡ください。

ＪＡいわて中央 紫波：TEL 676-3490 矢巾：TEL 697-6211
都南：TEL 638-0011 盛岡：TEL 656-3700 本所：TEL 673-7485