

カメムシ一斉防除の実施について

時下、各位におかれましてはますますご健勝の事とお慶び申し上げます。

下記日程により、カメムシの一斉防除を実施されますようお願い致します。

★ひとめぼれの特別栽培はスタークル1回、それ以外はトレボンとスタークルの2回防除です。

※水稻の生育は、平年並みから若干進んでいます。（7/1 現在 JA 調査） 出穂は、平年並みから若干早いと見込まれます。

※カメムシの発生は、平年より早く発生量が多い予報です。

品種名	出穂期予測（出穂 40～50％）
ヒメノモチ	7月27日 ～ 7月31日
銀河のしずく	8月1日 ～ 8月5日
もち美人	8月2日 ～ 8月6日
ひとめぼれ	8月3日 ～ 8月7日
こがねもち	8月6日 ～ 8月10日

散布回数	作業内容・品種区分	作業予定日	薬剤ほか	防 除 方 法
	一斉草刈り	7月下旬まで		畦畔・転作田・水稻圃場周辺等の草刈り
【1回のみ】	飼料用米・WCS・牧草・ 休耕田、転作田	8月1日～11日		トレボン粉剤DL 1.5kg/10a （額縁散布） ※ 環境保全事業の【そば】作付圃場には、散布出来ませんのでご注意ください。
【第1回目】 （出穂始めに散布）	もち品種 （こがねもち除く） （全品種・全栽培区分）	7月27日～8月2日		（1）トレボン粉剤DL 3kg/10a （2）トレボン乳剤 2000倍 100L
【第2回目】	もち品種 ※（1回目 こがねもち） （全品種・全栽培区分）	8月2日～8月10日		（1）スタークル粉剤DL 3kg/10a （2）スタークル顆粒水溶剤 2000倍 60～150L （3）スタークルH粒剤 1kg/10a（1回散布のみ）住居地帯 スタークルH粒剤は、市街地（住宅街）や他の作物（収穫中の野菜） などの隣接地を主体に使用します。
【1回のみ】 （出穂期に散布）	うるち品種 （全品種・全栽培区分）			
【第2回目】	うるち品種（慣行栽培） もち品種（2回目こがねもち）	8月11日～8月17日		（1）トレボン粉剤DL 3kg/10a （2）トレボン乳剤 2000倍 100L

※朝・夕方の無風状況での散布が基本ですので、天候を確認の上、作業を実施して下さい。

※隣接する畑作物や近隣の養蜂飼育農家と連絡を取り、薬害等の無いように注意しましょう。

※無人ヘリ防除日程は、裏面に記載しております。また、防除日程は雨天によって前後するので、ご了承下さい。