

7月2日に開催された「りんご防除予察会議」の内容についてご連絡いたします。

定期防除 第9回防除について

散布量：全体系 10a当り 550ℓ

一般栽培

- | | | | |
|---------------|----------|----|-------------------|
| ①ミネクトエクストラ SC | 10,000 倍 | 殺虫 | 1,000ℓあたり 100 ml |
| ②オキシラン水和剤 | 800 倍 | 殺菌 | 1,000ℓあたり 1.25 kg |
| ③カルスパ | 1,000 倍 | 石灰 | 1,000ℓあたり 1 kg |

散布期間：7月6日～7月10日

※ダニの発生が見られる場合はカネマイトフロアブル 1,000 倍を混用する。

※褐斑病の前年発生園や斑点落葉病の発生が目立つ園地では、ユニックス顆粒水和剤 47 の 2,000 倍の散布を検討する。ただし、カネマイトフロアブルを混用する場合、4 種混合となるため単用で特別散布する。

今回の防除ポイント

長雨対策としてアピオンEの2,000倍の加用を検討してください。加用する場合は先に入れてください。

ミネクトエクストラ SC は高濃度製剤のため、希釈倍率は 10,000 倍です。間違えないようご注意ください。また、オキシラン水和剤の希釈倍率が昨年と変更になっています。

(注) りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。
※腐らん病は確認したならすぐにせん除、削り取り等適切に処置してください。

次回予察会議：令和8年7月23日(木)18:00～

- ※ 農作業事故には十分注意し作業を行ってください。
- ※ 不明な点がございましたらご連絡ください。

JAいわて中央	紫波：TEL 676-3490	矢巾：TEL 697-6211
都南：TEL 638-0011	盛岡：TEL 656-3700	本所：TEL 673-7485



7月2日に開催された「りんご防除予察会議」の内容についてご連絡いたします。

定期防除 第10回防除について

散布量：全体系 10a当り 550ℓ

一般栽培

- | | | | |
|-------------|--------|----|---------------|
| ①スタークル顆粒水溶剤 | 2,000倍 | 殺虫 | 1,000ℓあたり500g |
| ②ダイパワー水和剤 | 1,000倍 | 殺菌 | 1,000ℓあたり1kg |
| ③カルスパ | 1,000倍 | 石灰 | 1,000ℓあたり1kg |

散布期間：7月16日～7月20日

※ダニの発生が見られる園地で、前回カネマイトフロアブルを散布していない場合は、カネマイトフロアブル1,000倍を混用する。

今回の防除ポイント

長雨対策としてアピオンEの2,000倍の加用を検討してください。加用する場合は先に入れてください。

斑点落葉病・輪紋病の重点防除時期となりますので、散布ムラの無いようしっかりと防除しましょう。

(注) りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。

※腐らん病は確認したならすぐにせん除、削り取り等適切に処置してください。

次回予察会議：令和8年7月23日(木)18:00～

※ 農作業事故には十分注意し作業を行ってください。

※ 不明な点がございましたらご連絡ください。

J Aいわて中央	紫波：TEL 676-3490	矢巾：TEL 697-6211
都南：TEL 638-0011	盛岡：TEL 656-3700	本所：TEL 673-7485



