

7月23日に開催された「りんご防除予察会議」の内容についてご連絡いたします。

定期防除 第11回防除について

散布量：全体系 10a当り 550ℓ

一般栽培

- ①フリントフロアブル25 2,000倍 殺菌 1,000ℓあたり500ml
- ②サムコルフロアブル10 5,000倍 殺虫 1,000ℓあたり200ml

散布期間：7月28日～8月2日

※ダニの発生が見られる場合は、アカリタッチ乳剤 2,000～3,000倍を散布する。

※褐斑病の発生が見られる園地は、トップジンM水和剤の1,500倍を散布する。

定期防除 第12回防除について

散布量：全体系 10a当り 550ℓ

一般栽培

- ①ダイパワー水和剤 1,000倍 殺菌 1,000ℓあたり1kg

散布期間：8月9日～8月14日

※ダニの発生が見られる場合は、ダニオーテフロアブル 2,000倍を散布する。

※今回の防除ポイント

シンクイムシ類の被害果を発見した場合は水漬け等の処分を徹底しましょう。

ダニオーテフロアブルを散布する際は、近接散布による効果の低下を避けるため、オキシラン水和剤（銅剤）散布後1ヶ月以上経過していることを確認してください。

（注）りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。

※腐らん病は確認したならすぐにせん除、削り取り等適切に処置してください。

次回予察会議：令和8年8月17日(月)18:00～

※ 農作業事故には十分注意し作業を行ってください。

※ 不明な点がございましたらご連絡ください。

JAいわて中央

紫波：TEL 676-3490

矢巾：TEL 697-6211

都南：TEL 638-0011

盛岡：TEL 656-3700

本所：TEL 673-7485

