

8月17日に開催された「りんご防除予察会議」の内容についてご連絡いたします。

定期防除 第13回防除について

散布量：全体系 10a当り 550ℓ

一般栽培

- ① アグロスリン水和剤 1,000倍 殺虫 1,000ℓあたり 1kg
- ② ストライド顆粒水和剤 1,500倍 殺菌 1,000ℓあたり 666g

散布期間：8月21日～8月26日

※ワタムシの発生が見られる場合はトランスフォームフロアブル 2,000倍の散布を検討する。

今回の防除ポイント

早生品種の収穫が始まります。軟果に注意しながら、収穫遅れの無いように作業を進めましょう。

【ダニの発生が見られる場合】

- ・ダニオーテフロアブルを まだ散布していない
⇒ 今回の散布にダニオーテフロアブル 2,000倍を混用する
※4種混合にならないように注意してください
- ・ダニオーテフロアブルを すでに散布済み
⇒ オマイト水和剤 750倍を特別散布（防除暦どおり）する

（注）りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。

※ 腐らん病は確認したならすぐにせん除、削り取り等適切に処置してください。

次回予察会議：令和8年9月3日（木）18:00～

※ 農作業事故には十分注意して作業を行ってください。

※ 不明な点がございましたらご連絡ください。

J A いわて中央 紫波：TEL 676-3490 矢巾：TEL 697-6211

都南：TEL 638-0011 盛岡：TEL 656-3700 本所：TEL 673-7485

